

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA



Figura 1.



Figura 2.

Aneurisma poscirugía aórtica demostrado con angiorresonancia

Varón de 75 años de edad con antecedentes personales de hipertensión arterial de difícil control. Ocho años antes presentó un síndrome aórtico agudo. La ecocardiografía transesofágica puso de manifiesto la presencia de un hematoma intramural que afectaba a la aorta descendente torácica. Ante la presencia de hemotórax izquierdo, se procedió a la colocación de un injerto aórtico término-terminal. Acudió a la revisión refiriendo disfonía y dolor mecánico en la región axilar y supraclavicular izquierdas.

En la radiografía de tórax (fig. 1) se objetivó una gran masa en la región pulmonar superior izquierda. La angiorresonancia de la aorta (fig. 2), realizada tras la inyección de gadolinio en una vena periférica, con-

firmó la presencia de un pequeño aneurisma (asterisco interior) inmediatamente distal al injerto (flechas) y un gran aneurisma (asterisco superior) inmediatamente proximal al injerto que comprime los troncos supraaórticos.

Recientemente se ha colocado un dispositivo intravascular (*stent*) para excluir el aneurisma de la circulación. En la primera revisión el paciente refiere que el dolor ha desaparecido aunque persiste cierto grado de disfonía.

Paula Tejedor^a, José Alberto San Román^a
y José María Sierra^b

^aInstituto de Ciencias del Corazón (ICICOR).
Hospital Universitario. ^bCentro Diagnóstico. Valladolid. España.