



# Revista da ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

[www.ramb.org.br](http://www.ramb.org.br)



## Acreditação

## Atualização em dismenorrea primária: tratamento

## Update on primary dysmenorrhea: treatment

Wanderley M. Bernardo\*, Maurício Paulo Angelo Mieli, Pérsio Yvon Adri Cezarino,  
Paulo Francisco Ramos Margarido e Ricardo Simões

Projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira, São Paulo, SP, Brasil

Nesta seção são encontradas perguntas elaboradas a partir da seção Diretrizes em foco publicada na RAMB 59(5).

### Questões

Marque nas questões de múltipla escolha a seguir a alternativa com a resposta que considerar correta.

- 1 A utilização do etoricoxibe no tratamento da dismenorrea primária apresenta eficácia
  - a superior ao naproxeno?
  - b A eficácia analgésica é superior
  - c A eficácia analgésica é semelhante
  - d A eficácia analgésica é inferior
  - e O tempo para atingir analgesia é significativamente inferior
- 2 Em mulheres portadoras da dismenorrea primária, o uso do valdecoxibe apresenta eficácia analgésica superior ao naproxeno?
  - a A eficácia analgésica é semelhante
  - b A eficácia analgésica é superior
  - c A eficácia analgésica é inferior
  - d O número de eventos adversos é significativamente inferior
- 3 Em mulheres portadoras da dismenorrea, o uso do rofecoxibe apresenta eficácia superior ao naproxeno?
  - a A eficácia analgésica é superior
  - b A eficácia analgésica é inferior
  - c A eficácia analgésica é semelhante
  - d O número de eventos adversos é semelhante

- 4 Em mulheres portadoras da dismenorrea primária, o uso do lumiracoxibe apresenta eficácia superior ao naproxeno?
  - a O número de eventos adversos é significativamente superior
  - b A eficácia analgésica é inferior
  - c A eficácia analgésica é superior
  - d A eficácia analgésica é semelhante
- 5 A utilização do piroxicam no tratamento da dismenorrea primária apresenta eficácia superior ao ibuprofeno?
  - a A eficácia analgésica é superior
  - b A eficácia analgésica é semelhante
  - c A eficácia analgésica é inferior
  - d O tempo para atingir analgesia é significativamente inferior

### Referência

Bernardo WM, Silveira LB, Silvia BM, Ribeiro BO, Maciel KR, Favero LB, Marchini JS, Buzzini RF. Suplementação com zinco no tratamento da anorexia nervosa. Rev Assoc Med Bras. 2013;59(5):413-9.

### Respostas

Respostas ao Cenário Clínico «Atualização em suplementação com zinco no tratamento da anorexia nervosa» [RAMB 2013;59(4):420.]

1. D
2. A
3. C
4. D
5. B

\* Autor para correspondência.

E-mail: [diretrizes@amb.org.br](mailto:diretrizes@amb.org.br) (W.M. Bernardo)

0104-4230/\$ – see front matter

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ramb.2013.10.004>